

## Instrucciones de Preparación para EGD-Bravo™ para Pacientes que Toman Medicamentos Agonistas de GLP-1

### 7 Días ANTES del Procedi- miento

- **Detenga los inhibidores de la bomba de protones (IBP)** como pantoprazol (Protonix®), omeprazol (Prilosec®, Zegerid®), rabeprazol (AcipHex®) o lansoprazol (Prevacid®).
- **Pacientes que toman Ozempic®, Semaglutida, Mounjaro®, Wegovy®, Rybelsus®, Trulicity®, Victoza® o medicamentos genéricos similares para la diabetes o la reducción de peso** deben DEJAR de tomarlos al menos 7 días antes de su procedimiento. Esto debe hacerse bajo la dirección de su médico prescriptor. Por su seguridad, su procedimiento será reprogramado si toma estos medicamentos dentro de los 7 días previos a su procedimiento.
- **VEA el video de Bravo en nuestro sitio web** para obtener información importante sobre su prueba:  
<https://www.granitepeaksgi.com/prep-instructions-egd-bravo-glp/>

### 3 Días ANTES del Procedi- miento

- **Detenga** los bloqueadores H2 como ranitidina (Zantac®), cimetidina (Tagamet®), famotidina (Pepcid®, Fluxid®) o nizatidina (Axid®).

**AVISO: NUESTRA OFICINA PUEDE LLAMAR EL DÍA ANTERIOR PARA AJUSTAR SU HORA DE LLEGADA A MEDIDA QUE FINALIZAMOS EL HORARIO DEL CENTRO.**

### El Día ANTES de su Procedi- miento:

- **DETENGA** el uso de antiácidos de venta libre de cualquier tipo.
- **NO DESAYUNE. DEJE DE CONSUMIR TODOS LOS ALIMENTOS SÓLIDOS.** No consuma sólidos, lácteos ni bebidas alcohólicas hasta después de su procedimiento.
- **BEBA al menos 8 vasos (64 oz) de líquidos TRANSPARENTES durante el día y la noche.**
- **LÍQUIDOS TRANSPARENTES (NADA ROJO O MORADO):**

Agua	Bebidas deportivas	Café/Té negro
Caldo	Gelatina	Refrescos (claros u oscuros)
Jugo (sin pulpa)	Paletas heladas	

### Día del Procedi-

- Puede continuar bebiendo líquidos transparentes hasta 2 horas antes de su llegada.
- **NO tome** medicamentos para reducir el ácido, anticoagulantes o medicamentos para la diabetes/pérdida de peso.
- Tome sus otros medicamentos recetados regularmente al menos dos (2) horas antes de su hora de llegada.
- **NADA POR BOCA durante las 2 horas previas a su hora de llegada: no agua, mentas ni chicle.**

**ESTE ES UN PROCEDIMIENTO CON SEDANTE. UN CONDUCTOR RESPONSABLE DEBE PERMANECER EN LA INSTALACIÓN DURANTE TODA SU CITA. (90-120 minutos en total). NO HAY EXCEPCIONES.**

Find Additional Information and Instructions on Our Website:

[www.GranitePeaksGI.com](http://www.GranitePeaksGI.com)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta al 801-619-1115.**

### MEDICINAS

- Excepto según se indique a continuación, toma tus medicamentos recetados regularmente con pequeños sorbos de agua al menos dos (2) horas antes de llegar.
- **NO tome** medicamentos para reducir el ácido, anticoagulantes o medicamentos para la diabetes/pérdida de peso.
- Lee a continuación para obtener información sobre anticoagulantes o medicamentos para diabéticos/pérdida de peso.

### Diabéticos - INSULINA o MEDICAMENTOS ORALES

- **Por favor, contacta a tu médico recetante para el cuidado diabético** si tienes alguna pregunta sobre la dosificación de tus medicamentos orales o de insulina.
- **No tomes medicamentos orales para la diabetes o insulina el día de tu procedimiento.**
- Prueba tu nivel de azúcar en la sangre antes de venir para tu procedimiento y trae el resultado contigo.

### PACIENTES DIABÉTICOS/ PÉRDIDA DE PESO - Semaglutida, Agonistas del Receptor GLP-1

- **Si toma alguno de estos medicamentos para la diabetes o pérdida de peso, hable con su médico recetante para obtener instrucciones sobre cómo DETENER de manera segura el medicamento al menos 7 días antes de su procedimiento.**
- **Ejemplos:** Ozempic®, Rybelsus®, Mounjaro®, Wegovy®, Trulicity®, Victoza® o medicamentos similares compuestos o genéricos.
- Monitoree sus niveles de azúcar en la sangre mientras esté fuera del medicamento. Ajuste la insulina en consecuencia.

### ANTICOAGU- LANTES

- Si está tomando anticoagulantes recetados, llame al médico recetante y pregunte si puede dejar de tomar el medicamento durante el tiempo requerido antes de su procedimiento
- Puede continuar tomando ibuprofeno, aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios hasta el día anterior a su procedimiento. **NO** los tome el día DE su procedimiento.

### Traer contigo

- **Deje objetos de valor y teléfonos/dispositivos en casa o con su conductor.**
- **Identificación con foto y tarjeta de seguro.**
- **Su inhalador, si usa uno.**
- **Diabéticos, traigan su lectura de azúcar en la sangre de la mañana y su insulina, si la usan.**
- **Lista de todos los medicamentos**, vitaminas y suplementos que está tomando (incluya la dosis y la última fecha y hora en que se tomó cada medicamento antes de su llegada)
- Use una camisa de manga corta.