

Instrucciones de preparación para EGD/ERCP Para pacientes que toman medicamentos agonistas de GLP-1

7 Días ANTES del Procedi- miento

Los pacientes que toman Ozempic®, Semaglutida, Mounjaro®, Wegovy®, Rybelsus®, Trulicity®, Victoza® u otros medicamentos genéricos similares para la diabetes o la reducción de peso deben **SUSPENDER** su uso al menos 7 días antes de su procedimiento. Hágalo bajo la dirección de su médico prescriptor. Por su seguridad, su procedimiento será reprogramado si se han tomado estos medicamentos dentro de los 7 días previos a su procedimiento.

Comprar: líquidos claros según se indica a continuación

AVISO: NUESTRA OFICINA PODRÍA LLAMAR EL DÍA ANTERIOR PARA AJUSTAR SU HORA DE LLEGADA MIENTRAS FINALIZAMOS EL HORARIO DEL CENTRO.

El Día ANTES de su Procedi- miento:

- **NO DESAYUNO. SUSPENDA TODOS LOS ALIMENTOS SÓLIDOS.** No consuma alimentos sólidos, productos lácteos ni bebidas alcohólicas hasta después de su procedimiento.
- **BEBER al menos 8 vasos (64 oz) de líquidos** claros durante todo el día y la noche. LÍQUIDOS CLAROS (NADA ROJO O MORADO):

Agua	Bebidas deportivas	Café/Té negro	Caldo
Gelatina	Refrescos (claros u oscuros)	Jugo (sin pulpa)	Paletas heladas

Día del Procedi- miento:

- **DOS (2) HORAS ANTES DE SU LLEGADA:**
- Puede seguir bebiendo líquidos claros hasta dos (2) horas antes de su llegada.
- Tome sus medicamentos recetados regularmente (excepto anticoagulantes o medicamentos para la diabetes/pérdida de peso según se describe).
- **Use los dos (2) enemas Fleet® según las indicaciones del paquete.**

ESTE ES UN PROCEDIMIENTO CON SEDANTE. UN CONDUCTOR RESPONSABLE DEBE PERMANECER EN LA INSTALACIÓN DURANTE TODA SU CITA (90-120 minutos en total). SIN EXCEPCIONES.

Información Importante:

DIABÉTICOS - INSULINA

- **No tome medicamentos orales para la diabetes ni insulina el día de su procedimiento.**
- **Si toma alguno de los medicamentos mencionados anteriormente para la diabetes o la pérdida de peso, consulte con su médico para recibir instrucciones sobre cómo suspender el medicamento de manera segura al menos 7 días antes de su procedimiento.**
- Monitoree los niveles de azúcar en sangre mientras esté sin medicación. Ajuste la insulina según sea necesario.

ANTICOAGULANTES

- Si está tomando anticoagulantes recetados, llame al médico que se los prescribió para preguntar si puede suspender el medicamento por el tiempo requerido antes de su procedimiento.
- Puede seguir tomando ibuprofeno, aspirina y medicamentos similares de venta libre hasta el día antes de su procedimiento. **NO** los tome el día del procedimiento.

TRAIGA CON USTED:

- **Deje los objetos de valor y el teléfono/dispositivos** en casa o con su conductor.
- Lleve su identificación con foto y tarjeta de seguro.
- Lleve su inhalador, si usa uno.
- Lleve su lectura de azúcar en sangre e insulina, si la usa.
- **Lleve una lista de todos los medicamentos**, vitaminas y suplementos (incluya la dosis y la última fecha/hora en que los tomó antes de su llegada).
- Use una camisa de manga corta.

Find Additional Information and Instructions on Our Website

www.GranitePeaksGI.com